







HU

Ez a használati útmutató fontos információkat tartalmaz.
Kérjük, hogy az Eroxon® alkalmazása előtt figyelmesen olvassa el.

MIT TARTALMAZ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ?

- Mi az **Eroxon®** és milyen esetben alkalmazható?
- Tudnivalók az **Eroxon®** alkalmazása előtt
- Hogyan kell alkalmazni az **Eroxon®**-t
- Lehetséges mellékhatások
- Hogyan kell az **Eroxon®**-t tárolni
- A csomag tartalma és egyéb információk

1. MI AZ EROXON® ÉS MÍLYEN ESETBEN ALKALMAZHATÓ?

Az Eroxon® egy klinikailag bizonyított hatású gélkezelés felnőtt (18 éves és idősebb) férfiak számára, akik merevedési zavarban (más néven impotenciában) szenvednek. Ilyenkor a férfi nem tud megfelelő erősségű erekciót elérni vagy fenntartani a kielégítő szexuális tevékenységhez.

Az **Eroxon®** egyedülálló fizikai hűtő, majd melegítő hatásával serkenti a véráramlást a péniszben, így segít megfelelő erősségű merevedést elérni és fenntartani a szexuális együttülthez. Az **Eroxon®** csak akkor segít az erekció elérésében, ha szexuálisan izgatott (stimulált) állapotban van.

2. TUDNIVALÓK AZ EROXON® ALKALMAZÁSA ELŐTT

Ne alkalmazza az Eroxon®-t, ha:

- Ön **allergiás** a (6. pontban felsorolt) összetevők bármelyikére.
 - Az orvosa azt tanácsolta Önnek, hogy **kerülje a szexuális tevékenységet**.
 - Bármilyen betegségben vagy **péniszdeformításban** (például Peyronie-kór) szenved.
 - A bőr a péniszén **vörös vagy fájdalmas**, vagy sérültnek vagy repedezettnek tűnik.
- Figyelmeztetések és óvintézkedések:**
A szexuális tevékenység többletterhelést jelenthet a szívnek. Ha szívproblémája van, vagy azt gyanítja, hogy szívproblémája lehet, beszéljen kezelőorvosával.

Fontos, hogy az Eroxon® használatának első 6 hónapjában a lehető leghamarabb felkeresse kezelőorvosát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a merevedési problémáit nem egy másik súlyos egészségügyi probléma okozza.

Még ha egészségesnek is érzi magát, a merevedési problémái más súlyos egészségügyi problémákkal is összefügghetnek. A merevedési zavar lehet korai jele:

- szív- és érrendszeri problémáknak,
- cukorbetegségnek,
- magas vérnyomásnak,
- magas koleszterinszintnek,

- májbetegségnek vagy alkoholizmusnak,
- vesebetegségnek,
- sclerosis multiplexnek.

Ha még nem tette meg, feltétlenül beszéljen kezelőorvosával a tüneteiről.

Az Eroxon® alkalmazása előtt, annak biztosítása érdekében, hogy Ön elég jó egészségügyi állapotban legyen a szexuális élethez, tájékoztassa kezelőorvosát, ha:

- Könnyű vagy mérsékelt aktivitás (pl. 20 perc gyors gyaloglás vagy két lépcsősor megmászása) esetén nagyon kiállud vagy fájdalom jelentkezik a mellkasban. Előfordulhat, hogy az orvosának ellenőriznie kell, hogy a szíve bírja-e a szex által okozott többletterhelést.
- Előfordult már olyan erekciója, amely fizikai vagy pszichés stimuláció nélkül is 4 óránál tovább tartott (úgynevezett priapizmus), vagy olyan betegségben szenved, amely priapizmust okozhat. A priapizmust okozó betegségek közé tartozik a sarlósejtes vérszegénység (a vörösvérsejtek rendellenessége), a leukémia (a vérsejtek daganatos megbetegedése) vagy a myeloma multiplex (csontvelőrák).

- Egyéb fontos információk**
- Az **Eroxon®** csak akkor lesz előnyös az Ön számára, ha problémái vannak az erekció elérésével vagy fenntartásával.
 - A merevedési zavar kezelésére szolgáló kezelések nem mindenkinél hatásosak. Ha az **Eroxon®** nem válik be Önnek, egyeztessen kezelőorvosával az alternatív kezelési lehetőségekről.
 - A legtöbb férfi esetében az **Eroxon®** már az első vagy a második próbálkozásnál beválik. Ha már jó ideje nem volt képes erekciót elérni vagy fenntartani, akkor szűkség lehet néhány próbálkozásra a kívánt hatás eléréséig.
 - Az **Eroxon® nem fogamzásgátló, és nem tartalmaz spermicid összetevőket.**

- Nem véd** a szexuális úton terjedő fertőzések (STI-k) ellen.
- Az **Eroxon® csak latex óvszerekkel kompatibilis.**
- Az **Eroxon® nem sikosító.** Az **Eroxon®** azonban biztonságosan használható személyes használatra szolgáló sikosítókkal.
- Erekciós működését életmódbeli változtatásokkal is **javíthatja**; ezek közé tartozik a rendszeres testmozgás, a stressz csökkentése, a dohányzás elhagyása és a túlzott alkoholfogyasztás kerülése. Ha depressziót vagy szorongást érez, beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével, aki további tanácsokkal tudja ellátni Önt.

Ha bármilyen súlyos incidens történik az eszközzel kapcsolatban, azt jelenteni kell a gyártónak, valamint azon ország illetékes hatóságának, amelyben tartózkodik.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI AZ EROXON®-T

Az **Eroxon®** egyadagos tubusban kerül forgalomba.
Mikor alkalmazza: A gél közvetlenül a szexuális együttüttlét előtt alkalmazza.
Hogyan kell felbontani a tubust: Csavarja le a kupakot. Szúrja át a tubus lezárását a kupak tetejével. Erősen nyomja össze a tubust, hogy az összes tartalom kiürüljön belőle, biztosítva a megfelelő adagot (körülbelül borsószemnyi mennyiségű gél).
Mennyit kell alkalmazni: Vigye fel egy tubus tartalmát **a makkjára** (a). Ha nincs körülmetélve, a gél felvitеле előtt óvatosan húzza vissza az előbőrt, amennyire kényelmes.

Hogyan alkalmazza: Masszírozza be a gél t a makk bőrébe körülbelül 15 másodpercen át. A gél alkalmazhatja saját maga, vagy az előjáték részeként partnere is felviheti. Az **Eroxon®** csak akkor segít erekciót elérni, ha szexuálisan izgatott állapotban van. Önnek és a partnerének ugyanúgy javasolt lefolytatniuk az előjátékot, mintha nem használna kezelést merevedési zavarára.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Ritkán az **Eroxon®** használat a bőrirritációt (égő, viszkető vagy fájdalmas érzés) okozhat. Hagya abba az **Eroxon®** használatát, ha Ön vagy partnere bármilyen irritációt tapasztal. Ha az irritáció továbbra is fennáll, beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

5. HOGYAN KELL AZ EROXON®-T TÁROLNI

Használat előtt ellenőrizze a tubuson feltüntetett lejáratí időt. A lejáratí idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik. Ha a tubus sérült, ne használja. Dobja ki a tubust, és használjon újat.

6. A CSOMAG TARTALMA ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az **Eroxon®** 4 db egyadagos tubusból álló kiszerelésben kapható.
Összetevők: Víz, etanol (35%), propilénlglikol, glicerín, karbomer, kálium-hidroxid.

RO

Aceste instrucțiuni de utilizare conțin informații importante pentru dumneavoastră. Vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza Eroxon®.

CE CONȚIN ACESTE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE?

- Ce este **Eroxon®** și la ce se utilizează
- Ce trebuie să știți înainte de a utiliza **Eroxon®**
- Cum se utilizează **Eroxon®**
- Posibile efecte secundare
- Cum se păstrează **Eroxon®**
- Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE EROXON® ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ
Eroxon® este un tratament cu gel, cu eficacitate dovedită clinic, pentru bărbații adulți (cu vârsta de 18 ani și peste) cu disfuncție erectilă (cunoscută și sub numele de impotență). Aceasta este situația în care un bărbat nu poate obține sau menține o erecție suficient de tare pentru o activitate sexuală satisfăcătoare.
Eroxon® stimulează circulația sângelui în penis printr-un efect fizic unic de răcire și apoi de încălzire, ajutându-vă să obțineți și să mențineți o erecție suficient de tare pentru sex.
Eroxon® vă va ajuta să obțineți o erecție numai dacă sunteți excitat sexual (stimulat).

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE DE A UTILIZA EROXON®

Nu utilizați Eroxon® dacă:

- Sunteți alergic la oricare dintre ingrediente (enumerare în secțiunea 6).
 - Ați fost sfătuit de către medicul dumneavoastră să evitați activitatea sexuală.
 - Aveți orice boală sau deformare a penisului (cum ar fi boala Peyronie).
 - Pielea de pe penis este roșie sau inflamată sau pare deteriorată sau fisurată.
- Atenționări și precauții:**
Activitatea sexuală poate pune o presiune suplimentară asupra inimii. Dacă aveți o problemă cardiacă sau credeți că ați putea avea o problemă cardiacă, trebuie să vorbiți cu medicul dumneavoastră.

Este important să faceți un control la medicul dumneavoastră cât mai curând posibil în primele 6 luni de utilizare a Eroxon® pentru a vă asigura că problemele dumneavoastră de erecție nu sunt cauzate de o altă afecțiune gravă de sănătate.

Chiar dacă vă simțiți sănătos, problemele dumneavoastră de erecție pot fi legate de alte afecțiuni grave de sănătate. Disfuncția erectilă poate fi un semn timpuriu de:

- probleme cardiace și ale vaselor de sânge
- diabet
- tensiune arterială ridicată

- colesterol ridicat
- boală hepatică sau alcoolism
- boală renală
- scleroză multiplă

Ar trebui să discutați despre simptomele dumneavoastră și despre aceste afecțiuni cu medicul dumneavoastră, dacă nu ați făcut-o deja.

Înainte de a utiliza Eroxon® pentru a vă asigura că sunteți suficient de apt pentru a face sex, spuneți medicului dumneavoastră dacă:

- Rămâneți fără respirație sau simțiți vreo durere în piept la o activitate ușoară sau moderată (de exemplu, mersul pe jos în pas voi timp de 20 de minute sau urcarea scărilor a două etaje). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să verifice dacă inima dumneavoastră poate suporta efortul suplimentar pe care îl presupune sexul.
- Ați avut vreodată o erecție care a durat mai mult de 4 ore, chiar și fără nicio stimulare fizică sau psihică (numită priapism) sau aveți orice afecțiune care poate provoca priapism. Printre afecțiunile care pot provoca priapism se numără siclemia (o anomalie a celulelor roșii din sânge), leucemia (cancer al celulelor sanguine) sau mielomul multiplu (cancer al măduvei osoase).

Alte informații importante:

- Eroxon®** vă va aduce beneficii numai dacă aveți probleme în obținerea sau menținerea unei erecții.
- Este posibil ca tratamentele pentru disfuncția erectilă să nu funcționeze pentru toată lumea. Discuțați cu medicul dumneavoastră despre opțiunile alternative de tratament dacă **Eroxon®** nu funcționează în cazul dumneavoastră.
- Pentru majoritatea bărbaților, **Eroxon®** va funcționa la prima sau a doua încercare. Dacă a trecut ceva timp de când nu ați mai reușit să obțineți sau să mențineți o erecție, este posibil să fie nevoie de câteva încercări înainte de a obține efectul dorit.
- Eroxon®** nu este un contraceptiv și nu conține ingrediente spermicide. Acesta nu protejează împotriva infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS).
- Eroxon®** este compatibil numai cu prezervativele din latex.
- Eroxon®** nu este un lubrifiant. Cu toate acestea, este sigură utilizarea Eroxon®cu lubrifianți personali.
- Vă puteți îmbunătăți funcția erectilă prin schimbări în stilul de viață; acestea includ exerciții fizice regulate, reducerea stresului, renunțarea la fumat și evitarea consumului excesiv de alcool. Dacă vă simțiți deprimat sau anxios, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului, care vă va putea oferi sfaturi suplimentare.

Orice incident grav care a avut loc în legătură cu acest dispozitiv medical trebuie raportat producătorului și autorității competente din țara în care vă aflați.

3. CUM SE UTILIZEAZĂ EROXON®

Eroxon® este furnizat într-un tub cu doză unică.
Când se utilizează: Aplicați gelul chiar înainte de a face sex.
Cum se deschide tubul: Desurubați capacul. Perforați garnitura tubului cu partea superioară a capacului. Strângeți bine tubul pentru a goli tot conținutul, ceea ce va asigura doza corectă (aproximativ o cantitate de gel de mărimea unui bob de mazăre).

Cât de mult se aplică: Aplicați conținutul unui tub **pe capul penisului** (imaginea (a)). Dacă sunteți necircumcis, trageți ușor prepuțul înapoi cât mai mult posibil înainte de a aplica gelul.

Cum se aplică: Masați gelul pe capul penisului timp de aproximativ 15 secunde. Puteți aplica singur gelul sau partenera/partenerul dumneavoastră poate aplica gelul ca parte a preludiului.

Eroxon® vă va ajuta să obțineți o erecție numai dacă sunteți excitat sexual. Dumneavoastră și partenera/partenerul dumneavoastră ar trebui să vă implicați în preludiu la fel cum ați face-o dacă nu ați utiliza un tratament pentru disfuncția erectilă.

4. POSIBILE EFECTE SECUNDARE

Rareori, utilizarea **Eroxon®** poate provoca iritații ale pielii (senzații de arsură, mâncărime sau durere). Întrerupeți utilizarea **Eroxon®** dacă dumneavoastră sau partenera/partenerul dumneavoastră prezentați orice iritație. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă iritația persistă.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ EROXON®

Verificați data de expirare de pe tub înainte de utilizare. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. Dacă tubul este deteriorat, nu-l utilizați. Aruncați tubul și folosiți unul nou.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Eroxon® este disponibil în pachete de 4 tuburi cu doză unică.
Ingrediente: Apă, etanol (35%), propilenglicol, glicerină, karbomer, hidroxid de potasiu.

CZ

Příbalová informace – návod k použití obsahuje pro Vás důležité informace. Dříve, než začnete přípravek Eroxon® užívat, pozorně si je přečtěte.

CO NALEZNETE V TÉTO PŘÍBALOVÉ INFORMACI?

- Co je **Eroxon®** a k čemu se používá
- Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek **Eroxon®** užívat
- Jak se přípravek Eroxon® užívá
- Možné nežádoucí účinky
- Jak přípravek **Eroxon®** uchovávat
- Obsah balení a další informace

1. CO JE EROXON® A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Eroxon® je klinicky ověřená gelová léčba pro dospělé muže (od 18 let) s erektilní dysfunkcí (známou také jako impotence). Jde o případ, kdy muž nemůže dosáhnout nebo udržet erekci dostatečně tvrdou pro uspokojivou sexuální aktivitu.

Eroxon® stimuluje průtok krve v penisu prostřednictvím jedinečného fyzikálního chladicího a následně zahřívacího účinku, čímž vám pomáhá dosáhnout a udržet erekci dostatečně tvrdou pro pohlavní styk.
Eroxon® vám pomůže dosáhnout erekce pouze tehdy, pokud jste sexuálně vzrušený (stimulovaný).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK EROXON® UŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Eroxon®, jestliže:

- jste alergický na některou ze složek (uvedených v bodě 6).
- Vám Váš lékař doporučil, abyste se vyhýbal sexuální aktivitě.
- máte nějaké onemocnění nebo deformace penisu (například Peyronieho choroba).
- je kůže na penisu zarudlá nebo bolestivá nebo se zdá být poškozená či porušená.

Upozornění a opatření:
Sexuální aktivita může vaše srdce mimořádně zatěžovat. Pokud máte problémy se srdcem nebo se domníváte, že byste je mohl mít, měl byste se poradit se svým lékařem.

Je důležité, abyste co nejdříve během prvních 6 měsíců užívání přípravku Eroxon® podstoupil kontrolu u svého lékaře, abyste se ujistil, že vaše problémy s erekcí nejsou způsobeny jiným závažným zdravotním problémem.

I když se cítíte zdravý, vaše problémy s erekcí mohou souviset s jinými závažnými zdravotními problémy. Erektilní dysfunkce může být časným příznakem:

- problémů se srdcem a cévami,
- cukrovky,
- vysokého krevního tlaku,
- vysokého cholesterolu,

- onemocnění jater nebo alkoholismu,
- onemocnění ledvin,
- roztroušené sklerózy.

Pokud jste tak ještě neučinili, měl byste své příznaky a tyto stavy probat se svým lékařem.

Abyste se ujistil, že jste k pohlavnímu styku dostatečně zdravý, před použitím přípravku **Eroxon®** informujte svého lékaře, jestliže:

- se při lehké nebo středně těžké aktivitě (např. při 20minutové rychlé chůzi nebo při výstupu do dvou pater po schodech) velmi zadýcháte nebo pocítujete bolest na hrudi. Váš lékař možná bude muset zkontrolovat, zda Vaše srdce snese další zátěž spojenou s pohlavním stykem.
- jste někdy měl erekci, která trvala déle než 4 hodiny i bez jakéhokoli fyzického nebo psychického podnětu (tzv. priapismus), nebo trpíte jakýmkoli onemocněním, které může způsobit priapismus.

Mezi onemocnění, která mohou způsobit priapismus, patří srpkovitá anémie (abnormalita červených krvinek), leukémie (rakovina krevních buněk) nebo mnohočetný myelom (rakovina kostní dřeně).

Další důležité informace

- Přípravek **Eroxon®** vám přinese výhody, pouze pokud máte problémy s dosažením nebo udržením erekce.
- Léčba erektilní dysfunkce nemusí fungovat u každého. Pokud u Vás přípravek **Eroxon®** nezabírá, poraďte se se svým lékařem o alternativních možnostech léčby.
- U většiny mužů bude přípravek **Eroxon®** fungovat na první nebo druhý pokus. Pokud se vám již nějakou dobu nedaří dosáhnout nebo udržet erekci, může trvat několik pokusů, než dosáhnete požadovaného účinku.
- Přípravek Eroxon® není antikoncepční přípravek a neobsahuje žádné spermicidní složky. Nechrání před pohlavně přenosnými infekcemi (STI).
- Přípravek **Eroxon®** je kompatibilní pouze s latexovými kondomy.
- Přípravek **Eroxon®** není lubrikant. Použití přípravku **Eroxon®** s osobními lubrikanty je však bezpečné.
- Erektilní funkci můžete zlepšit změnou životního stylu, například pravidelným cvičením, snížením stresu, zanecháním kouření a vyvarováním se nadměrného požívání alkoholu. Pokud se cítíte depresivně nebo úzkostně, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka, který Vám poskytne další rady.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli ze závažných nežádoucích účinků, ke kterému došlo v souvislosti s tímto prostředkem, sdělte to výrobci a příslušnému orgánu členského státu uživatele nebo pacienta.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK EROXON UŽÍVÁ:

Přípravek **Eroxon®** se dodává v jednodávkové tubě.
Kdy se používá: Gel aplikujte těsně před pohlavním stykem.
Jak otevřít tubu: Odšroubujte uzávěr. Pomocí horní části uzávěru propichnete těsnění tuby. Pevně stiskněte tubu, aby se vyprázdnil celý obsah, čímž získáte správnou dávku (přibližně množství gelu o velikosti hrášku).
Kolik je třeba použít: Obsah jedné tuby naneste na žalud penisu (a). Pokud nemáte obřízku, před aplikací gelu jemně stáhněte předkožku co nejvíce dozadu.
Jak gel nanášet: Gel vmasírujte na žalud penisu po dobu asi 15 sekund. Gel si můžete aplikovat sami nebo ho může aplikovat Vaše partnerka v rámci přede hry.
Přípravek **Eroxon®** Vám pomůže dosáhnout erekce pouze tehdy, pokud jste sexuálně vzrušený. Vy i vaše partnerka byste se měli věnovat přede hře stejně, jako byste nepoužívali léčbu erektilní dysfunkce.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Vzácně může používání přípravku Eroxon® způsobit podráždění kůže (pocit pálení, svědění nebo bolestivosti). Pokud se u Vás nebo Vaší partnerky objeví podráždění, přestaňte přípravek Eroxon® používat. Pokud podráždění přetrvává, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

5. JAK PŘÍPRAVEK EROXON® UCHOVÁVAT

 30°C Před použitím zkontrolujte datum spotřeby na tubě. Datum spotřeby se vztahuje k poslednímu dni daného měsíce. Pokud je tuba poškozená, nepoužívejte ji. Tubu vyhodte a použijte novou.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Přípravek **Eroxon®** je k dispozici v baleních po 4 jednodávkových tubách.
Složení: Voda, ethanol (35 %), propylenglykol, glycerin, karbomer, hydroxid draselný.

SK

Tento návod na použití obsahuje pre vás dôležité informácie. Pred použitím lieku Eroxon® si ho pozorne prečítajte.

ČO JE V TOMTO NÁVODE NA POUŽITIE?

- Čo je **Eroxon®** a na čo sa používa
- Čo potrebujete vedieť pred tým, ako použijete **Eroxon®**
- Ako používať **Eroxon®**
- Možné vedľajšie účinky
- Ako uchovávať **Eroxon®**
- Obsah balenia a ďalšie informácie

1. ČO JE EROXON® A NA ČO SA POUŽÍVA

Eroxon® je klinicky overená gélová liečba pre dospelých mužov (vo veku od 18 rokov) s erektilnou dysfunkciou (známou aj ako impotencia). Ide o stav, keď muž nemôže dosiahnuť alebo udržať dostatočnú erekciu na uspokojivú sexuálnu aktivitu.
Eroxon® stimuluje prietok krvi v penise prostredníctvom jedinečného fyzikálneho chladiaceho a následne zahrievacieho účinku, čím vám pomáha dosiahnuť a udržať dostatočnú erekciu na pohlavný styk.
Eroxon® vám pomôže dosiahnuť erekciu len vtedy, ak ste sexuálne vzrušený (stimulovaný).

2. ČO POTREBUJETE VEDIEŤ PRED TÝM, AKO POUŽIJETE EROXON®
Nepoužívajte Eroxon®, ak:

- stealergický** na ktorúkoľvek zo zložiek (uvedených v časti 6);
 - vám váš lekár odporučil vyhnúť sa **sexuálnej aktivite**;
 - máte akékoľvek ochorenie alebo deformáciu penisu (napríklad Peyronieho chorobu);
 - je koža na vašom penise červená alebo bolestivá alebo sa zdá byť poškodená či popraskaná.
- Upozornenia a opatrenia**
Sexuálna aktivita môže vaše srdce mimoriadne zaťažovať. Ak máte problémy so srdcom alebo si myslíte, že by ste mohli mať problémy so srdcom, mali by ste sa poradiť so svojim lekárom.

Je dôležité, aby ste počas prvých 6 mesiacov používania lieku Eroxon® čo najskôr absolvovali preventívnu prehliadku u svojho lekára, aby ste sa ujistili, že vaše problémy s erekciou nie sú spôsobené iným závažným ochorením.

Aj keď sa cítite zdravý, vaše problémy s erekciou môžu súvisieť s inými závažnými ochoreniami. Erektilná dysfunkcia môže byť skorým príznakom:

- problémov so srdcom a krvnými cievami,
- cukrovky,
- vysokého krvného tlaku,
- vysokého cholesterolu,

- ochorenia pečene alebo alkoholizmu,
- ochorenia obličiek,
- sklerózy multiplex.

O svojich príznakoch a týchto ochoreniach by ste sa mali porozprávať so svojim lekárom, ak ste to ešte neurobili.

Aby ste sa uistili, že ste dostatočne zdravý na to, aby ste mohli mať pohlavný styk, pred tým, ako začnete používať Eroxon®, sa obráťte na svojho lekára, ak:

- sa pri ľahkej alebo stredne ťažkej aktivite (napr. pri 20-minútovej rýchlej chôdzi alebo pri výstupe po dvoch poschodiach) veľmi zadýchate alebo pocítite bolesť na hrudníku. Váš lekár možno bude musieť skontrolovať, či vaše srdce znesie dodatočnú záťaž pri sexe;
 - ste niekedy mali erekciu, ktorá trvala viac ako 4 hodiny aj bez akejkoľvek fyzickej alebo psychickej stimulácie (tzv. priapizmus), alebo máte akékoľvek ochorenie, ktoré môže spôsobiť priapizmus. Medzi ochorenia, ktoré môžu spôsobiť priapizmus, patrí kosáčiková anémia (abnormalita červených krviniek), leukémia (rakovina krvných buniek) alebo mnohočetný myelóm (rakovina kostnej drene).
- Dalšie dôležité informácie**
- Eroxon®** bude pre vás prínosom len v prípade, že máte problémy s dosiahnutím alebo udržaním erekcie.

